

achē

DECONGEX

GRIFE

paracetamol +
maleato de clorfeniramina +
cloridrato de fenilefrina

APRESENTAÇÕES

Cápsulas duras de 400 mg + 4 mg + 4 mg;
embalagens com 10, 20 ou 120 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada cápsula dura de Decongex Gripe contém:
paracetamol400 mg
maleato de clorfeniramina.....4 mg
cloridrato de fenilefrina.....4 mg
Excipientes: talco, estearato de magnésio,
amido, gelatina, dióxido de titânio, amarelo
de quinolina, amarelo crepúsculo, verme-
lho allura 129 laca de alumínio, vermelho de
azorrubina e amarelo de tartrazina.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Decongex Gripe é indicado no tratamento dos
sintomas de gripes e resfriados.

Decongex Gripe é destinado ao alívio da con-
gestão nasal, coriza, febre, dor de cabeça e do-
res musculares presentes nos estados gripais.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Decongex Gripe atua a nível de sistema ner-
voso central promovendo a diminuição da
febre e da sensibilidade à dor. Além disso,
bloqueia a liberação de certas substâncias res-
ponsáveis pelos efeitos alérgicos, diminuindo
edema, coriza e rinite, possibilitando o des-
congestionamento nasal. O início do efeito
ocorre em 15 minutos após a administração.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Decongex Gripe é contraindicado para pa-
cientes com hipersensibilidade aos compo-
nentes da fórmula, pressão alta, doença car-
díaca, diabetes, glaucoma, hipertrofia da
próstata, doença renal crônica, insuficiência
hepática grave, disfunção tireoidiana, gravi-
dez e lactação sem controle médico.

**Este medicamento é contraindicado para
menores de 18 anos.**

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento não deve ser administrado con-
comitantemente com inibidores da MAO (mo-

noaminoxidase), como a fenelzina, com barbi-
túricos, como o fenobarbital ou com álcool.

Alterações em exames laboratoriais

Os testes de função pancreática utilizando a
bentiromida ficam invalidados, a menos que
o uso do medicamento seja descontinuado 3
(três) dias antes da realização do exame.

Na determinação do ácido 5-hidroxi-indolacé-
tico utilizando o reagente nitrosonaftol, falsos
valores aumentados podem ser produzidos.

Pacientes idosos

É recomendado o uso sob orientação médica.

**Este medicamento não deve ser utilizado
por mulheres grávidas sem orientação mé-
dica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da
lactação depende da avaliação e acompa-
nhamento do seu médico ou cirurgião-den-
tista.**

**Atenção: Este medicamento não deve ser
utilizado com outros produtos contendo
paracetamol. Não consumir bebidas al-
coólicas.**

**Você não deve dirigir veículos ou operar
máquinas durante todo o tratamento, pois
sua habilidade e capacidade de reação po-
dem estar prejudicadas.**

**Atenção: Contém os corantes dióxido de ti-
tânio, amarelo de quinolina, amarelo cre-
púsculo, vermelho allura 129 laca de alu-
mínio, vermelho de azorrubina e amarelo
de tartrazina que podem, eventualmente,
causar reações alérgicas.**

**Este produto contém amarelo de TAR-
TRAZINA, que pode causar reações alér-
gicas, como a asma, especialmente em pes-
soas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-den-
tista se você está fazendo uso de algum ou-
tro medicamento.**

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C
a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e va-
lidade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de va-
lidade vencido. Guarde-o em sua embala-
gem original.**

Características físicas e organolépticas:
cápsulas duras com corpo amarelo e tampa
vermelha.

**Antes de usar, observe o aspecto do medi-
camento. Caso ele esteja no prazo de vali-
dade e você observe alguma mudança no
aspecto, consulte o farmacêutico para sa-
ber se poderá utilizá-lo.**

4038888 PH 1228 BU 01 VP BU150152900 05/25

BU DECONGEX GRIFE 400+4+4MG BU150152900.indd 1

150mm

27/05/2025 09:23

Produto: BU DECONGEX GRIFE 400+4+4MG
Código/Code: BU150152900
Dimensional: 150x250mm (União Q.)
Data/Date: 13/03/2025

Cores/Colors

Preto/Black

Aprovado por/ Approved by

O Fornecedor é responsável pela produção na íntegra e de acordo com o PDF aprovado. O Fornecedor não tem autorização de alterar qualquer informação deste documento. Qualquer divergência ou dúvida entre em contato com a Editoração Gráfica Aché. The Supplier is responsible for production in full and in accordance with the approved PDF. The Supplier is not authorized to change any information in this document. Please contact us if you have any problem.

achē

EDITORACÃO GRÁFICA | GRAPHIC PUBLISHING

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? USO ORAL

Adultos (de 18 a 60 anos): 1 cápsula a cada 4 horas.

Ingerir com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidas.

Limite máximo diário: não tomar mais de 5 cápsulas ao dia.

Duração do tratamento: enquanto durarem os sintomas, respeitando o limite máximo de 3 dias ou a critério médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvida sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento de alguma dose, seguir o tratamento conforme as dosagens recomendadas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Durante o tratamento, podem surgir as seguintes reações adversas:

Reação muito comum (ocorre em 10% ou mais dos pacientes que utilizam este medicamento): sonolência, náuseas.

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor ocular, tontura, palpitações, boca seca, desconforto gástrico, diarreia, tremor, sede.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): agitação, ardência ocular, flatulência, sudorese, turvação visual.

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): irritação no estômago, insônia, cansaço.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Procurar auxílio médico para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Promover esvaziamento gástrico através da indução de êmese ou lavagem gástrica.

A N-acetilcisteína, administrada por via oral, é um antídoto específico para toxicidade induzida pelo paracetamol, devendo ser instituída nas primeiras 24 horas.

Medidas de manutenção do estado geral devem ser observadas, como hidratação, balanço hidroeletrólítico e correção de hipoglicemia.

A síndrome de abuso do Decongex Gripe é caso raro de intoxicação por uso excessivo e prolongado do medicamento associado a sintomas de esquizofrenia, como, por exemplo, alucinações. O uso deste medicamento deve acontecer de forma racional, na posologia indicada na bula e por um curto período de tempo. Por isso, ao persistirem os sintomas, procure um médico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro: 1.0573.0113

Registrado por:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - 20º andar
São Paulo - SP
CNPJ 60.659.463/0029-92
Indústria Brasileira

Produzido por:

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
Brasília - DF

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 20/03/2025.



4038888 PH 1228 BU 01 VP BU150152900 05/25